

No dia do exame deve:

- Fazer **jejum de 4 horas**;
- Pode tomar medicação habitual

IMPORTANTE:

Nas **24 horas antes** da realização do exame deve:

- **Suspender os seguintes fármacos:** Medicamentos que contenham **teofilina** (Eufilina®, Unicontin®, Aminofilina, Filotempo®) ou **dipiridamol** (Aggrenox®, Persantin®), **betabloqueadores** (Concor®, Cosyrel®, Dilbloc®, Carevalam®, Isoprolol®, Carvedilol®, Nebilet®, Nebivolol®, Metoprolol®, Lopressor®, Inderal®, Tenormin®), **bloqueadores de cálcio** (Amlodipina®, Norvasc®, Verapamil®, Isoptin®, Nifedipina®, Adalat®, Etizem®, Diltiem®, Diltiazem®, Herbesser®, Iercanidipina, felodipina), **vasodilatadores** (nitratos, pensos transdérmicos com nitratos, Nitradisc®, Epinitril®, Nitrodur®, Indur®, Monoket®, Monopront®, Nitromint®, Flindix®, mononitrato de isossorbido, dinitrato de isossorbido, Dancor®), Ranolazina (Ranexa®);
- **Suspender o consumo de bebidas e alimentos com cafeína** (Ex: chá, café, cevada, meia de leite, ice-tea, coca-cola, etc...), na dúvida se contém ou não cafeína, opte por não tomar;
- **Chocolate ou bebidas com chocolate;**
- **Suspender o consumo de tabaco e substitutos de nicotina** (por exemplo pensos e pastilhas de nicotina).

O que deve trazer no dia do exame:

- Análises ao sangue que tenha efetuado.
- Exames anteriores à mesma região.

Se tiver dúvidas ou necessitar de qualquer outro esclarecimento, pode:

- Dirigir-se pessoalmente às nossas unidades,
- Telefonar para o nosso call center,
- Caso não encontre algum produto mencionado, por favor contacte-nos.

Se, por qualquer razão, não puder comparecer no dia/hora marcada, por favor informe-nos.