

BIOPSIA TRANSRETAL

Corresponde à colheita de pequenos fragmentos da próstata por picada transretal, após anestesia local. Este procedimento é controlado por ecografia (idêntica à ecografia transretal), não atinge zonas vulneráveis.

PREPARAÇÃO:

- Deverá iniciar prevenção de infecção, caso não tenha já um antibiótico prescrito pelo seu médico assistente, com o antibiótico **Fosfomicina 3000mg**, uma saqueta **3 horas antes** e outra **24h depois** do procedimento. Este tratamento inicia-se no dia da biopsia, devendo ser respeitado rigorosamente caso não existam contraindicações;
- Se toma medicamentos antiagregantes plaquetários (AAS, Cartia, Ticklyd, etc.), deverá suspendê-los uma semana antes, retomando 24 horas após efetuar a biópsia;
- Se toma medicamentos anticoagulantes, como por exemplo Varfine ou similares, deverá contactar previamente o seu médico para os suspender ou substituir;
- A ampola rectal deve estar vazia para que no decurso da biópsia o risco de infecção seja menor. No início da manhã do dia do exame fazer um clister com uma unidade de Microlax, para forçar o esvaziamento da ampola retal;
- Deve tomar 1 hora antes do exame duas pastilhas de paracetamol (500mg) e um ansiolítico, eventualmente Diazepam 10mg (implica vir acompanhado e não poder conduzir);

O que deve trazer no dia do exame:

- Deve comparecer 15 minutos antes da hora do exame;
- Análises ao sangue que tenha efetuado;
- Exames anteriores à mesma região.

Caso se considere esclarecido sobre o procedimento a que vai ser submetido, dê o seu consentimento para a sua realização, assinando o consentimento informado que lhe será entregue no dia da realização do exame.

Se tiver dúvidas ou necessitar de qualquer outro esclarecimento, pode:

- Dirigir-se pessoalmente às nossas unidades;
- Contactar o nosso Call Center.

Se, por qualquer razão, não puder comparecer no dia/hora marcada, por favor informe-nos.